



抗生物質の前投薬をされる方へ

抗生物質の前投薬とは、抜歯や外科処置をする際に血液中に細菌が一時的に入っても、抵抗力をつけておくためにあらかじめ抗生物質を飲んでおく方法です。

以下の疾患をお持ちの方は、処置前に抗生物質を飲んでおくことが有効とされています。

- ☆重度の糖尿病がある方
- ☆重度の腎臓病がある方
- ☆骨粗鬆症のお薬を長期に飲まれている方
- ☆ステロイドを長期に飲まれている方
- ☆免疫抑制剤を飲まれている方
- ☆心臓疾患のある方(人工弁、感染性心内膜炎の既往、先天性の心疾患、心臓弁膜症、閉塞性肥大型心筋症、弁逆流を伴う僧房弁逸脱)

内服のスケジュールは以下の通りです。

次回の予約の時間の1~2時間前に、お渡ししたお薬を事前に飲んでおいてください。

☆お薬の名前

☆飲む量

☆飲む日時

月 日 時頃にお薬を飲まれてください。

~参考~

アモキシシリン成人 2g、小児 50 mg/kg を術前1時間前に内服。必要があればその後4~6時間後成人 500 mgを内服。その後は通常量(250 mg)を内服。

もしくは

アジスロマイシン成人 500 mg、小児 15 mg/kg を術前1時間前に内服。その後は翌日から2日間内服継続。